

脱脂奶粉

货号：ZY-BL002

产品简介

脱脂奶粉一般用于Western Blot实验中作为封闭液。使用脱脂奶粉配制成溶液作为封闭剂或抗体稀释溶液，可以有效减少一抗或二抗和膜的非特异性结合，降低背景，增强信噪比。常用TBST作为溶剂，建议使用浓度3%-5%。

基本属性

英文名称	skimmed milk powder
别名	奶粉
纯度	99%
外观（性状）	白色至淡黄色粉末
储存条件	室温
单位	瓶
规格	5ml
相关类别	生化试剂，其它
溶解性	溶于水
有效期	12个月



使用说明

生化试剂的用法用量主要根据客户的实验目的和现有文献或书籍中的实验方法来决定，以下用途仅供参考。

1.一般用于Western Blot实验中作为封闭液。使用脱脂奶粉配制成溶液作为封闭剂或抗体稀释溶液，可以有效减少一抗或二抗和膜的非特异性结合，降低背景，增强信噪比。常用TBST作为溶剂，建议使用浓度3%-5%；

2.可用于制备微生物培养基，在微生物培养上，脱脂奶粉可单独或用作复合微生物培养基的组分之一，比如试管配置的10%脱脂奶粉溶液可用于乳酸菌的维持和扩增培养，特别适合梭菌属内的物种分化。

注意事项

现配现用，按需配制，溶液不可长期保存。

为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

